


EDENTULISMO TOTAL


Od. M. Magdalena Diblasi

CLASIFICACIÓN DE MISCH

- ▶ PF-1 Prótesis fija: reemplaza solamente la corona.
- ▶ PF-2 Prótesis Fija: reemplaza la corona y parte de la raíz.
- ▶ PF-3 Prótesis Fija: reemplaza corona, encía y hueso (encía artificial). Híbrida.
- ▶ PF-4 Prótesis removible: sobredentadura implanto soportada.
- ▶ PF-5 Prótesis removible: sobredentadura implanto mucosoportada.



CLASIFICACIÓN ALBAREZ CANTONI



PRÓTESIS REMOVIBLE SISTEMA DE BARRAS O ABROCHADAS

- ▶ Entre 2 y 6 implantes (4).
- ▶ La retención es con caballitos. Metálicos, plásticos o mixtos.
- ▶ Retención adicional con ball-attach.
- ▶ Dejar espacio para la higiene.

DESVENTAJAS

- ▶ La prótesis tiene movilidad.
- ▶ Vascula
- ▶ Necesita el recambio de los caballitos



BALL-ATTACH

- ▶ Es un sistema simple para trabajar.
- ▶ Accesible para le paciente.
- ▶ Lleva dos implantes, a la altura de los caninos.
- ▶ Deben estar paralelos
- ▶ Requiere cazoletas y o´rings.
- ▶ Se torquea a 30 N.
- ▶ Necesita mayor espacio protésico, que el sist. locator

INDICACIONES PARA EL PACIENTE


- ▶ Requiere higiene diaria. Limpieza perimplantaria periódica.
- ▶ Los O´Rings se desgastan y deben cambiarse.
- ▶ Al ser una prótesis implanto soportada se reabsorbe el hueso. Por lo tanto, va a necesitar un rebasado y/o cambio de prótesis



SISTEMA LOCATOR

Sistema registrado

- ▶ Prótesis abrochada.
- ▶ Pilar. Permite un disparalelismo de 20 a 40 grados.
- ▶ El sistema trae cápsulas con distintos teflones y un aditamento para transportarlos.
- ▶ Los o´rings vienen en distintos colores, según los kilos (negro, azul, rojo y blanco).
- ▶ El pilar se torquea a 30 N.



PRÓTESIS HÍBRIDA

La prótesis híbrida es fija para el paciente pero el odontólogo la puede remover desatornillando las chimeneas.

- ▶ Necesitan entre 6 y 8 implantes en el maxilar superior y entre 4 y 6 en el maxilar inferior.

FACTORES A TENER EN CUENTA

- ▶ Pérdida ósea en sentido anteroposterior y vertical
- ▶ Distancia entre hueso residual y la altura oclusal es menor a 12 mm. PF-1 o PF.
- ▶ Si la distancia hueso residual/altura oclusal es entre 12 y 15 mm. PF-3 o híbrida.
- ▶ Si la distancia es mayor a 16 mm se hace PF-4 o PF-5, que permiten compensar mejor las pérdidas óseas.

PRÓTESIS HÍBRIDA

DIAGNÓSTICO INTRAORAL

- ▶ Altura del hueso
- ▶ Espesor de la encía
- ▶ Si tiene prótesis, ver los flancos
- ▶ Tipo de antagonista
- ▶ Soporte labial
- ▶ Si no tiene prótesis hacer encerado de diagnóstico

DIAGNÓSTICO EXTRAORAL

- ▶ Longitud del labio superior
- ▶ Línea de la sonrisa
- ▶ Nivel de exposición dentaria



Muchas Gracias

Od. M. Magdalena Diblasi